

COMO PREVENIR E CONTER A DOENÇA?

- 1 Não transportar socas de zonas infectadas para áreas livres de doença.
- 2 Desinfectar calçados (botas) e equipamentos usados nos campos.
- 3 Usar variedades de bananas tolerantes à doença.
- 4 Remover e queimar plantas infectadas incluindo socas da geração seguinte mesmo que estas não apresentem sintomas.



Solicitar uma licença de importação fitossanitária ao Departamento de Sanidade Vegetal antes de importar mudas ou socas de outros países.



Entrar em contato com as Autoridades Agrícolas locais assim que os sintomas da doença forem encontrados.

FOLHETO INFORMATIVO

Fevereiro 2019

Departamento de Sanidade Vegetal - MASA
Dep.Sanidade.Masa@gmail.com



República de Moçambique
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar

DOENÇA DO PANAMA RAÇA TROPICAL 4

O QUE É?

Apoiado por



O QUE É?

A fusariose da banana (conhecido com o mal-do-panamá), é uma doença que tem afectado a produção de banana nas últimas décadas. A doença é causada por um fungo que impede a planta de receber nutrientes e água, sem os quais a planta murcha e eventualmente morre. Em 2013 confirmou-se a presença da estirpe raça tropical 4 do mal-do-panamá em Moçambique, o que tem vindo a ameaçar a produção de banana no país.

COMO SE PROPAGA?

O fungo propaga-se através de solo contaminado, ou seja, o fungo pode ser transportado pela planta mas também através de veículos, vestuário ou qualquer material que tenha estado em contacto com o solo.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

